



# Mouton Vendéen

## **EFFECTIFS**

70 000 brebis dont 7 064 sont engagées dans le programme de sélection de la race

Taille moyenne des troupeaux sélection : 244 brebis

## **QUALITES MATERNELLES**

Prolificité : 1.78  
Poids Age Type 30 jrs (PAT30) des mâles nés doubles : 11.2 kg

## **QUALITES BOUCHERES**

Poids des béliers : 110 à 130 kg  
Poids des brebis : 60 à 80 kg  
Gain Moyen Quotidien 30/70 jrs (GMQ30/70) des mâles nés simples : 310 g



Les Etablières

Route de Dompierre

85000 LA ROCHE SUR YON

Téléphone : 02 51 37 69 36

Télécopie : 02 51 62 38 98

Messagerie :

contact@mouton-vendeen.fr



## **ORIGINES / HISTORIQUE**

La race Mouton Vendéen est l'aboutissement d'un long travail de sélection sur une population ovine locale issue du Bas-Poitou commencé au XIIe lors des travaux d'assèchement du Marais Poitevin par les Hollandais. Ceux-ci apportèrent la race Flandrine pour améliorer la prolificité.

Bien plus tard, au XIXe, un apport de sang Merinos est effectué afin d'améliorer la qualité lainière de ses animaux du marais. S'ensuivent des croisements répétés avec la race Southdown afin d'améliorer la conformation de cette population.

Dans les années 30, le type racial commence à se fixer. La race est officiellement reconnue en 1967.

Aujourd'hui, la majorité des brebis de la race se trouve encore dans le berceau d'origine, dans les régions Pays de la Loire et Poitou-Charentes.

Ce travail a permis au Mouton Vendéen de devenir une race bouchère complète, polyvalente, répondant parfaitement aux attentes des éleveurs ovins et des transformateurs.

## **APTITUDES BOUCHERES**

Poids béliers adultes : 110 à 130kg

Poids brebis adultes : 60 à 80 kg

GMQ 30 – 70 j mâles simples: 310 g

Testage boucher pour produire des agneaux de boucherie :

sans gras,

classement U majoritaire (carcasses de 18 à 20kg en 120 jours)

plus de 50% de rendement

Utilisation des mâles en croisement :

sur races rustiques / prolifiques pour améliorer la conformation des agneaux de boucherie

sur d'autres races bouchères pour obtenir des femelles F1 conformées et maternelles (effet d'hétérosis)

## **APTITUDES MATERNELLES**

Prolificité (brebis >19 mois) : 1.78

PAT 30 jours (mâles nés doubles) : 11.2 kg

Agneaux qui naissent lainés

Lutte possible dès 8 mois

Saison sexuelle longue (de juillet à fin janvier) – bonne réponse au désaisonnement lumineux

Lutte des béliers possible toute l'année, même hors saison sexuelle

Bonne adaptabilité des brebis à une grande diversité de conduite d'élevage